


Post-Treatment Instructions - Bandage Contact Lens

A soft contact lens has been used to cover your corneal wound, to allow proper healing, with minimal discomfort. It is important that this bandage lens not be removed until the cornea has completely healed. Your doctor will remove the contact lens once this occurs (usually in 1-3 days). Follow these instructions closely to avoid lens dislocation:

- *Avoid activities that may involve eye injuries, such as sports, yard work, etc.*
- *Avoid rubbing your eye with fingers or tissues*
- *Avoid squeezing lids tightly*
- *Avoid air currents in face (hair dryers, fans, vents)*
- *Avoid using make-up products, lotions, and sunblock around eyes*
- *Avoid chemical fumes (hair dye, hair spray, paint, bar-b-que grills, household cleaners, smoke, air fresheners, aerosols, etc.)*
- *Avoid getting water in your eye, hot tubs, saunas, or swimming. You may wash your face, being careful around the eyes*
- *Avoid using alcohol-based hand cleaner / sanitizer*
- *Stay away from known allergens that cause eye irritation*
- *Avoid dusty or dirty environments, with air-borne irritants*
- *Continue taking other medications / eye drops as directed*
- *Sunglasses are strongly recommended and may be worn indoors if no other glasses are worn - to discourage eye rubbing and block air currents*
- *During winter, a cool mist humidifier may be useful to add additional air moisture in the home*
- *If your vision is significantly impaired, you are advised to avoid driving or operating heavy machinery, climbing ladders / scaffolding, etc.*



• You may experience dryness or discomfort during wear. After the first 12 hours, you may use non-preserved artificial tears in the eye every 3 hrs. Apply the drops carefully, making sure the dropper tip does not come in-contact with the eye, and you do not squeeze, or rub the eye after application.

During the post-procedure time, you will likely experience the following:

- *Blurred vision***
- *Contact Lens Awareness***
- *Mild watering***

Additionally, symptoms that were present before the membrane was applied may continue during your post-procedure recovery time - such as light sensitivity, pain, redness. However, if you experience new symptoms of redness, discharge, swelling, pain, or foreign body sensation, please contact your doctor immediately,

If your contact lens falls out, please contact your doctor immediately.

Español:

Se ha utilizado una lente de contacto blanda para cubrir la herida de la córnea, para permitir una curación adecuada, con un mínimo de molestias. Es importante que esta lente de contacto no se retire hasta que la córnea haya sanado por completo. Su médico le quitará la lente de contacto una vez que esto ocurra (normalmente en 1 a 3 días). Siga estas instrucciones al pie de la letra para evitar la dislocación de la lente:

- Evite actividades que puedan implicar lesiones oculares, como deportes, trabajos de jardinería, etc.**
- Evite frotarse el ojo con los dedos o pañuelos desechables**
- Evite apretar los párpados con fuerza Evite corrientes de aire en la cara (secadores de pelo, ventiladores, rejillas de ventilación)**
- Evite utilizar productos de maquillaje, lociones y bloqueador solar alrededor de los ojos**
- Evite vapores químicos (tinte para el cabello, laca para el cabello, pintura, parrillas para barbacoa, limpiadores domésticos, humo, ambientadores, aerosoles, etc.)**
- Evite que le entre agua en los ojos, jacuzzis, saunas o natación. Puede lavarse la cara, teniendo cuidado alrededor de los ojos**
- Evite usar desinfectantes o limpiadores de manos a base de alcohol Manténgase alejado de alérgenos conocidos que causan irritación ocular**
- Evite entornos polvorientos o sucios, con irritantes transmitidos por el aire**
- Continúe tomando otros medicamentos o gotas para los ojos según las indicaciones**

· **Se recomienda encarecidamente el uso de anteojos de sol y se pueden usar en interiores si no se usan otros anteojos, para evitar que se froten los ojos y bloquear las corrientes de aire**

· **Durante el invierno, un humidificador de vapor frío puede ser útil para agregar humedad adicional al aire en el hogar**

· **Si su visión está significativamente deteriorada, se le recomienda evitar conducir u operar maquinaria pesada, subir escaleras o andamios, etc.**

· **Puede experimentar sequedad o incomodidad durante el uso. Después de las primeras 12 horas, puede usar lágrimas artificiales sin conservantes en el ojo cada 3 horas. Aplique las gotas con cuidado, asegurándose de que la punta del gotero no entre en contacto con el ojo y de no apretar ni frotar el ojo después de la aplicación.**

Durante el período posterior al procedimiento, es probable que experimente lo siguiente:

- **Visión borrosa**
- **Sensación de sensibilidad a los lentes de contacto**
- **Lagrimeo leve**

Además, los síntomas que estaban presentes antes de la aplicación de la membrana pueden continuar durante el período de recuperación posterior al procedimiento, como sensibilidad a la luz, dolor y enrojecimiento.

Sin embargo, si experimenta nuevos síntomas de enrojecimiento, secreción, hinchazón, dolor o sensación de cuerpo extraño, comuníquese con su médico de inmediato.

Si se le cae el lente de contacto, comuníquese con su médico de inmediato.